

# CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

## LE SUIVI, LE VACCIN, LE FROTTIS

Plus de 95 % des cancers du col de l'utérus se développent suite à une infection par des HPV (*Human Papillomavirus*). Se faire vacciner contre cette infection et se soumettre au test de dépistage sont les bons réflexes à avoir pour prévenir la maladie.

DÈS LA PUBERTÉ, UN SUIVI GYNÉCOLOGIQUE RÉGULIER AUPRÈS DU MÉDECIN TRAITANT, D'UN GYNÉCOLOGUE OU D'UNE SAGE-FEMME.

DE 11 À 14 ANS\*

### LA VACCINATION

#### ... Pourquoi ?

Gardasil® et Cervarix® protègent contre 70 % des HPV à l'origine des cancers du col de l'utérus.

#### ... Comment ?

Trois injections de doses vaccinales réparties entre 6 mois et 1 an maximum.

\* Un rattrapage est possible jusqu'à 19 ans. Demandez à votre médecin.

DE 25 À 65 ANS

### LE FROTTIS CERVICO-UTÉRIN

#### ... Pourquoi ?

90 % des cancers du col de l'utérus seraient évités si les femmes de cette tranche d'âge se soumettaient tous les trois ans à ce test.

#### ... Comment ?

Tous les trois ans, après deux frottis normaux réalisés à deux ans d'intervalle.

#### Le saviez-vous ?

Le frottis peut être réalisé par : votre médecin traitant, un gynécologue, une sage-femme, un laboratoire d'analyse, un centre de santé ou de planification médicale.

La Fondation ARC, reconnue d'utilité publique, est 100 % dédiée à la recherche sur le cancer. Son objectif : contribuer à guérir deux cancers sur trois en 2025.

FONDATION ARC  
POUR LA RECHERCHE  
SUR LE CANCER



Reconnue d'utilité publique

[www.fondation-arc.org](http://www.fondation-arc.org)